Eder Bianchini², Richard dos Santos Nicolini², Jairo Rafael Machado Dias⁴, Adjalma Campos França Neto⁴, Elvino Ferreira⁵

RESUMO - Objetivou-se com esse trabalho, avaliar em época seca, a produtividade e na qualidade da forragem produzida em capim *Panicum maximum* cv Tanzânia. Usou-se o delineamento em blocos ao acaso com oito repetições. Os blocos eram de 3,0 x 5,0 m (15 m²), sendo formadas por sete linhas distantes 0,50 m entre si. A área útil foi representada pelas linhas centrais. Foram avaliados cinco tratamentos de cortes nas idades de 21, 42, 63 e 84 dias a partir do corte inicial, de uniformização (27.02.2009). Avaliou-se a % de matéria seca (%MS), % de proteína bruta (%PB) e % de fibra em detergente neutro (%FDN), sendo então calculados os níveis de nutrientes disponíveis como indicação ao diferimento. Pode ser verificado que aos 21 dias o principal fator limitante é a quantidade de energia (20,94 UA.ha⁻¹) seguida da produção de matéria seca (22,14 UA.ha⁻¹). Aos 42 dias, este passa a ser a proteína (32,09 UA.ha⁻¹) e energia (32,61 UA.ha⁻¹) e aos 63 e 84 dias a proteínas permanece como o fator limitante para a lotação dos animais.

Palavras-chave: Idades de corte; *Panicum maximum*; Matéria seca.

FORAGE PRODUCTION OF TANZANIA GRASS. NUTRITIONAL VALUE AND INDICATION FOR DEFERMENT

ABSTRACT - The objective of this study was to evaluate in the dry season, the yield and quality of forage produced in *Panicum maximum* cv Tanzania. It used a randomized block design with eight replications. The blocks were 3.0 x 5.0 m (15 m²) being formed by seven rows distant 0.50 m apart. The main area was represented by the central lines. Treatments were evaluated five cuts at ages 21, 42, 63 and 84 days from the initial cut, uniformity (27.02.2009). We evaluated the % dry matter (% DM), % crude protein (CP%) and % neutral detergent fiber (NDF%) were then calculated nutrient levels available as an indication of deferment. It can be seen that at 21 days the main limiting factor is the amount of energy (20.94 UA ha⁻¹) followed by dry matter production (22.14 UA ha⁻¹). At 42 days, this becomes the protein (32.09 UA ha⁻¹) and energy (32.61 UA ha⁻¹) and at 63 and 84 days the protein remains the limiting factor for the performance of animals.

Keywords - Cutting ages; *Panicum maximum*; Dry matter.

¹ Ação relativa ao Grupo de Estudos em Produção Animal e Aproveitamento de Resíduos (GEPAAR)

<http://www.unir.br/menus/pesquisa/gpesquisa.pdf> parte do Trabalho de Conclusão de Curso do primeiro autor.

² Discente do Curso de Agronomia – UNIR/Rolim de Moura

³ Professor do Departamento de Agronomia/UNIR, Rolim de Moura-RO.

⁴ Professor do Departamento de Medicina Veterinária/UNIR, Rolim de Moura-RO. Av. Norte Sul, 7300 – Nova Morada, Rolim de Moura-RO. CEP: 76940-000. Autor para correspondência: elvinoferreira@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

O diferimento é uma técnica de manejo de fácil realização e baixo custo que objetiva a produção de forragem com a vedação dos pastos e sua disponibilização para época seca. Com isso há a promoção de maior sobrevivência dos animais e mesmo aumento da taxa de lotação em comparação as áreas em uso no período de estacionalidade. Nesta época, contudo, a produtividade e a qualidade das gramíneas sofrem grande redução, refletindo negativamente na nutrição animal. O início do diferimento determinará a duração do período de crescimento do pasto. Este período de diferimento deve ser fundamentado na rebrotas das plantas forrageiras, que é afetada por fatores climáticos e de manejo (SANTOS et al., 2009). Assim o objetivo desse trabalho foi o de avaliar algumas variáveis nutricionais em *Panicum maximum* cv Tanzânia, submetido a diferentes idades de corte.

MATERIAL E METODOS

O estudo foi desenvolvido no Campo Experimental da Fundação Universidade Federal de Rondônia em Rolim de Moura (Latitude 11° 48' 13'' Sul e Longitude 61° 48' 12'' Oeste, a 277m de altitude). O clima da região Aw, segundo classificação de Köppen. O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, com as seguintes características (0-10cm): pH 6,2; Ca 2,4 cmol_c.dm⁻³; Mg 0,7 cmol_c.dm⁻³; K 0,21 cmol_c.dm⁻³; P 5,8 mg.dm⁻³ e V% = 48,5. O experimento teve início em fevereiro de 2009. Usou-se o delineamento em blocos ao acaso com oito repetições. Os blocos eram de 3,0 x 5,0 m (15 m²), sendo formadas por sete linhas distantes 0,50 m entre si. A área útil foi representada pelas linhas centrais. Foram avaliados as idades de cortes (30cm do solo) aos 21, 42, 63 e 84 dias a partir do corte de uniformização (27.02.2009), com o uso de um quadrado de ferro (50x50cm). O material colhido foi pesado e secado em estufa á 65°C com ventilação forçada

até peso constante. As avaliações foram: % de matéria seca (%MS), % de proteína bruta (%PB) e % de fibra em detergente neutro (%FDN).

Para a simulação de lotação no diferimento foi considerado 30 dias de ocupação da área diferida, ou seja, das produções de forragem nas áreas reservadas para os corte aos 21, 42, 63 e 84 dias. Considerou-se também a perda de forragem em 44%, representando a média dos valores citados (37 a 51%) em Heringer e Carvalho (2004). Em termos de nutrição animal, considerou-se que uma vaca leiteira com peso vivo de 450 kg, para produzir 10 kg de leite (3,5 % gordura) necessitaria de 1,33 kg dia⁻¹ de PB e de 6,45 kg dia⁻¹ de NDT. Um animal de 450 kg de peso vivo é considerado uma unidade animal (UA) e consome 2,5% de matéria seca por dia. Para a ingestão de FDN tomou-se a média dos valores de 1,6 a 1,8% do peso vivo (GOMIDE et al., 2001) e a estimativa dos teores dos nutrientes digestíveis totais foi feita a partir da equação de regressão, $Y = 83,79 - 0,4171 \text{ FDN}$ ($R^2 = 0,82$; $P < 0,01$) (CAPPELLE et al., 2001). Para a análise estatística usou-se o programa Bioestat 5.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a variável teor de matéria seca em capim Tanzânia pode ser observado seu aumento significativo quando comparado às idades de 21, 42 e 63 dias (21,73±6,69b; 21,26±1,51b; 20,08±6,71b, respectivamente) em relação ao último período de corte (28,61±3,06a). Este comportamento está relacionado com a idade da planta e principalmente com as condições ambientais, ou seja, avanço em relação ao período seco do ano. Confrontando destes dados com os da literatura verifica-se um teor médio para o capim Tanzânia de 25,7% (SOUZA et al., 2010). Também foram obtidas diferenças significativas em relação à produção de matéria seca. Quanto maior o período entre cortes (21, 42, 63 e 84 dias) maior a massa de forragem produzida (7.472,25c; 11.747,05c; 15.708,00b; 17.568,15a,

respectivamente). As produções crescentes são indicativos de sua produtividade, sendo citado 5.230 kg ha⁻¹ (SANTOS et al., 2003) ou mesmo 7.230 kg ha⁻¹ (QUADROS et al., 2002).

Para a simulação da capacidade de lotação foi considerada a massa e a qualidade da forragem em relação ao teor de proteína bruta (14,84; 10,90; 8,16 e 8,37% PB na MS) e a fibra em detergente neutra (70,87; 72,05; 76,92 e 70,78% FDN na MS). Para os nutrientes digestíveis totais (54,23; 53,73; 51,70 e 54,26% de NDT na MS) usou-se a equação citada em Cappelle et al., (2001). Assim, para a variável disponibilidade de matéria seca, depois de descontada 44% da massa de forragem perdida e passível de rejeição (HERINGER; CARVALHO, 2002), uma ocupação de 30 dias e um consumo de 11,25 kg de MS (2,5% PV d⁻¹), obteve-se lotações de 12,39; 19,49; 26,06 e 29,15 UA ha⁻¹. Contudo, a estimativa do consumo sem levar em consideração a qualidade da massa em oferta é um erro, uma vez que os níveis de proteína tenderam a se reduzir (14,84; 10,90; 8,16 e 8,37% PB na MS) e os de fibra em detergente neutro a aumentar (70,87; 72,05; 76,92 e 70,78% FDN na MS) no período estudado (21, 42, 63 e 84 dias após o corte de uniformização, respectivamente). Levado isso em conta e, observando que o limite de ingestão para FDN de 7,64 kg UA⁻¹ (GOMIDE et al., 2001), verifica-se a redução de consumo de MS (10,79; 10,61; 9,94 e 10,80 kg d⁻¹ MS), em relação aos 2,5% do PV, como também nos níveis de PB (1,60; 1,15; 0,81 e 0,90 kg d⁻¹ PB ingerida) para o período estudado (21, 42, 63 e 84 dias, respectivamente).

No tocante a qualidade observa-se, mesmo de maneira teórica, que o manejo do Tanzânia aos 21 dias é capaz de sustentar uma UA produzindo 10 kg de leite, quando se observa a variável PB (1,33 kg.d⁻¹) e necessitando de uma pequena quantidade de energia (6,45 – 5,85 = 0,6 kg.d⁻¹). Contudo com a entrada no período seco e com o amadurecimento da forragem tem-se uma redução nos componentes potencialmente digestíveis, gerando aumento no déficit nutricional, o que compromete a produção e gera a perda de peso nos animais em pastejo.

Para o manejo do Tanzânia na seca devem ser observados os parâmetros de qualidade nutricional aliando-se a ela a oferta de suplementação para o animal a fim de gerar um melhor aproveitamento dessa forrageira.

REFERÊNCIAS

- CAPPELLE, E.R.; VALADARES FILHO, S.C.; SILVA, J.F.C. et al. 2001. Estimativas do valor energético a partir de características químicas e bromatológicas dos alimentos. **R. Bras. Zootec.**, v.30, n.6, p.1837-1856.
- GOMIDE, J.A., WENDLING, I.J., BRAS, S.P., QUADROS, H.B. 2001. onsumo e produção de leite de vacas mestiças em pastagem de Brachiariadecumbens manejadas sob duas ofertas diárias de forragem. **Rev. Bras. Zootec.**, v. 30, n.4, p. 1194-1199.
- HERINGER, I.; CARVALHO, P.C.F. 2002. Ajuste da carga animal em experimento de pastejo: uma nova proposta. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 32, n. 4, p. 675-679.
- QUADROS, D. G. et al. 2002. Componentes da Produção de Forragem em Pastagens dos Capins Tanzânia e Mombaça Adubadas com Quatro Doses de NPK. **R. Bras. Zootec.**, Viçosa, v. 31, n. 3.p. 1333-1342 (Supl.).
- SANTOS, M. E. R. et al. 2009. Capim-braquiária diferido e adubado com nitrogênio: produção e características da forragem. **R. Bras. Zootec.**, Viçosa, v. 38, n. 4, Apr.P. 650-656.
- SOUSA, R. S. et al. 2010. Composição química de capim-tanzânia adubado com nitrogênio e fósforo. **R. Bras. Zootec.**, Viçosa, v. 39, n. 6. Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151635982010000600006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 04 Set. 2011.